

APUA LAPSEN ÄNKYTYKSEN VAIKEUSASTEEN ARVIOINTIIN			
	NORMAALI SUJUMATTOMUUS	LIEVÄ ÄNKYTYS	VAIKEA ÄNKYTYS
PUHE-KÄYTTÄYTYMINEN	Änkytys satunnaista, lyhyttä ei useammin kuin 1/10 lausteista Änkytyksen kesto alle 1/2 sek. äänneiden tai sanan alkutavujen toistoja tai lyhyiden sanojen toistoja (esim.ä-ä-äiti...) minä haluaisin jo kotiin)	Änkytys toistuvaa, pitempää enemmän kuin 3% puhutuista tavuista ja kestoaltaan 1/2-1 sek. Äänneiden ja tavujen ja lyhyiden sanojen toistelua ja satunnaisia venytyksiä (ä-ä-ä-äiti, mi-mi-mi-minä haluaisin jo kotiin.)	Änkytys usein toistuvaa, yli 10% puhutuista tavuista änkytetään änkytys pitkää, yli 1 sek. äänne- ja tavutoistoja, sanojen toistelua, äänneiden venytyksiä blockkeja (äääääääi---ti, mmmminä ha-ha-ha-ha----haluaisin joKotiin)
MUU KÄYTTÄYTYMINEN	Ajoittaisia taukoja, ujestelua tukisanoja, kuten "ää", "öö" "tota" sanojen vaihtamista ajatuksen vaihtamista	Toistoihin ja venytyksiin liittyy myötäliikkeitä esim. silmien räpyttelyä, katseen suunnan muutos, lihasjännitystä	Useammin ja näkyvämpiä myötäliikkeitä, äänen korkeus voi nousta lihasjännityksen kasvaessa
OIREET PAHIMMILLAAN	Väsyneenä, innostuneena Monimutkaisia ajatuksia selitettäessä tai kun kuuntelija ei kuuntele	Voi liittyä tiettyihin tilanteisiin, mutta on useammin havaittavissa kuin poissa kokonaan	Havaittaessa useimmissa puhetilanteissa, pysyvämpi, hyvät kaudet häviää
LAPSEN REAKTIOT	Ei havaittavissa	Havaitaan lievää huolestumista, turhautumista, hämmennystä	Selkeää hämmennystä, puhetilanteiden pelkoa
VANHEMPIEN REAKTIOT	Eivät reagoi	Useimmat huolestuneita, mutta ei vahvasti, vain vähäinen huoli	Kaikki vanhemmat huolestuvat voimakkaasti
TOIMINTAOHJE	Ota kantaa vain, jos vanhemmat tuovat esiin selkeää huolestumista	Ota kantaa, jos oireilu jatkuu 6-8 viikkoa tai jos vanhemmat tuovat esiin huolta	Ota kantaa HETI LÄHETÄ HETI puheterapeutille